


니코틴 비강 스프레이 일반 설명서

1. 니코틴 비강 스프레이를 사용하는 동안에는 담배를 피우지 않도록 하십시오. 약간 어지럽고 메스꺼움을 느끼게 할 수 있습니다.
2. 한 시간에 5 회 이상, 24 시간 동안 40 회 이상 사용하지 마십시오.
3. 콧구멍당 분무 1 개만 사용

1 단계: 펌프 준비

이 작업은 새 병을 처음 사용하기 전에 수행해야 합니다.

- 병의 측면에 있는 원을 눌러 캡을 제거하십시오.
- 휴지나 종이 타월을 사용하십시오.
- 병을 들고 엄지로 아래를 누릅니다. 미세 스프레이가 보일 때까지(3~4 회) 티슈에 펌핑합니다.
- 티슈를 버립니다.
- 각 비강 스프레이 병에는 약 100 회 분량(200 회 분무)이 들어 있지만, 과도한 준비는 사용 가능한 약의 양이 줄어듭니다.
- 과도한 준비를 피하십시오.



2 단계: 니코틴 비강 스프레이 사용하기

- 코를 풀기
- 머리를 약간 뒤로 젖히고 병의 끝을 콧구멍에 넣으세요.
- 입으로 숨 쉬기. 각각의 콧구멍에 한 번 뿌림. 스프레이를 뿌리는 동안 코를 통해 냄새를 맡거나 삼키거나 흡입하지 마십시오.
- 코를 풀기 전에 2, 3 분 정도 기다리세요.
- 사용 후 병에 캡을 덮습니다. 상온(F 86°F 이하)에서 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

3 단계: 사용 규칙

- 매일 사용하기
- 깨어있는 동안 한시간 마다 사용할 수 있고 필요시 더 자주 사용합니다.
- 하루 최대 40 회 용량/1 시간 내 최대 5 회 용량.