

Бупропион (также известен как Зибан® и Велбутрин®)

Бупропион (*Bupropion*), также известен как Велбутрин® (*Wellbutrin*®) - препарат, не содержащий никотин, применяемый для лечения табачной зависимости. Также он является антидепрессантом.

Бупропион лечит никотиновую абстиненцию и снижает тягу к сигаретам. Кроме того, люди, употребляющие Бупропион после отказа от курения, обычно набирают меньше веса, чем те, кто бросает курить без медикаментов.

Бупропион можно использовать отдельно или вместе с никотинсодержащими препаратами (например, пластырем или жевательной резинкой). Отпускается только по рецепту.

Бупропион обычно начинают принимать за одну-две недели до дня, когда вы планируете бросить курить (так называемая дата отказа). Препарат рекомендуется принимать от трех до шести месяцев. Наиболее частыми побочными эффектами приема Бупропиона SR являются сухость во рту, бессонница (проблемы со сном) и головная боль.



Бупропион следует применять строго согласно назначению. Этот препарат не рекомендуется людям с эпилепсией или расстройством пищевого поведения (например, булимией или анорексией).

Адаптировано из Руководства по приему лекарств. Уиллиамс ДжМ, Штайнбергг МЛ, Зимменнанн МН, Ганди КК, Стипельман Б, Бадсок ПД, Зидонис ДМ. Сравнение двух видов интенсивности консультирования по поводу табачной зависимости при шизофрении и шизоаффективном расстройстве. *J Subst Abuse Treat*, Июнь;38(4):384-93, 2010

